


Invasive Meningokokken-Erkrankungen

Arzt- und Labormeldungen: Inzidenz der Erkrankungen (BAG) und Todesfälle (BFS) 1900-2003

Infections invasives à méningocoques

Déclarations des médecins et des laboratoires: incidence des maladies (OFSP) et décès (OFS) 1900-2003



Die Y-Achse ist logarithmisch skaliert, um den Verlauf auf niedrigem Niveau sichtbar zu machen

Legende

- 1 Inzidenz: Fälle pro 100'000 Einwohner
- 1 Erkrankungsfälle
- 2 Todesfälle

L'axe Y est gradué logarithmiquement pour rendre visible l'évolution à faible niveau

Légende

- 1 Incidence: Cas pour 100'000 habitants
- 1 Cas de maladie
- 2 Décès

Kommentar

Die Inzidenz invasiver Meningokokken-Erkrankungen in der Schweiz erreichte 2003 den niedrigsten Stand seit 1987. Der Anteil der Stämme der Serogruppe C, der 2000 noch bei 61% lag, ist dabei weiterhin rückläufig und betrug 2003 35%.

Commentaire

En 2003, l'incidence des maladies invasives à méningocoques a atteint le niveau le plus bas depuis 1987. La proportion des souches du sérotype C, qui était en 2000 à 61%, diminue continuellement et atteint 35% en 2003.