

## Vaccinations recommandées aux groupes à risques / situations à risques (Risques accrus de complications et / ou d'exposition)

Remarque: Un groupe à risque / une situation à risque est définie comme ayant un risque accru par rapport à la population générale, dont le risque peut être faible, modéré ou élevé. Les recommandations spécifiques en matière de médecine de voyage ne figurent pas dans le tableau.

### 1. Risques accrus de complications

Hépatite B	Hépatite A	Varicelle	Influenza	Pneumocoques	Méningocoques	FSME	Rage	Tuberculose
Nouveau-nés de mères HBsAG positives	Hépatopathies chroniques	Jeunes adultes (<40 ans) n'ayant pas d'anamnèse de varicelle, en particulier les femmes avec désir d'enfants	Sujets >65 ans	Sujets >65 ans	Asplénie anatomique ou fonctionnelle, hyposplénie (anémie falciforme)			Nouveau-nés ou nourrissons < 12 mois originaires d'un pays à haute endémie et susceptibles d'y retourner
Hépatopathies chroniques		Enfants avec eczéma sévère	Cardiopathies ou pneumopathies chroniques	Prématurité < 32 semaines Poids de naissance <1500 g	Troubles immunologiques (défaut de réponses aux polysaccharides)			
Immunosuppression		Leucémies, lymphomes, myélomes	Insuffisance rénale	Cardiopathies ou pneumopathies chroniques	Déficits en facteurs terminaux du système du complément			
		Immunosuppression médicamenteuse (transplantation, maladies chroniques)	Hémoglobinopathies	Certains syndromes d'immunodéficience congénitaux ou acquis (VIH)	Déficits en facteurs de la voie alterne du complément			
		Infection à VIH asymptomatique ou sans immunosuppression	Toutes situations d'immunodéficience	Asplénie anatomique ou fonctionnelle hyposplénie (anémie falciforme)	Coagulopathies avec déficit homozygote en protéine S ou C			
			Maladies métaboliques	Immunosuppression médicamenteuse (transplantation, maladies chroniques)				
				Malformations de la base du crâne et/ou fistules LCR				
				Implant cochléaire				
				Syndrome néphrotique, insuffisance rénale				

