

19^e
Journée
de pathologie
infectieuse
pédiatrique
ambulatoire



Infovac-France
ACTIV
GPIP AFPA
Médecine & Enfance

Véronique Dufour
Robert Cohen

- ***Du fait de la pénurie de BCG SSI et de leur contingentement en PMI ou dans les CLAT, de plus en plus d'enfants sont vaccinés après 3 mois. Il leur est alors proposé un Tubertest[®] avant la vaccination pour vérifier sa négativité. Est-ce utile ?***

- **Non**, le Tubertest® n'est ni **assez sensible**, ni **assez spécifique** pour être utilisé en dépistage systématique
- Et il faut plusieurs mois pour qu'il devienne positif !
- En l'absence de tuberculose dans l'entourage, de situations particulières (adoption, professionnelle...), avant vaccination du nourrisson (- 6 mois ?- 9 mois ?)

InfoVac ne conseille pas de réaliser de Tubertest®, malgré les recommandations officielles actuelles

- **Non**, le Tubertest® n'est ni **assez sensible**, ni **assez spécifique** pour être utilisé en dépistage systématique
- Et il faut plusieurs mois pour qu'il devienne positif !
- En l'absence de tuberculose dans l'entourage, de situations particulières (adoption, professionnelle...), avant vaccination du nourrisson (- 6 mois ?- 9 mois ?

InfoVac ne conseille pas de réaliser de Tubertest®, malgré les recommandations officielles actuelles