

Recommandations pour la vaccination contre COVID-19 chez les personnes atteintes de maladies allergiques :

Vaccins à ARN :

Comirnaty® (Pfizer/BioNTech)

Moderna COVID-19 Vaccine®

Antécédents allergiques	Procédure
- alimentaires - à des aéro-allergènes - aux venins d'insectes/hyménoptères - à des médicaments oraux, rectaux ou parentéraux identifiés - à des médicaments non-identifiés avec réactions purement cutanées - Antécédents familiaux d'allergie	Le vaccin peut être administré. Surveillance de 15 minutes après la première dose du vaccin. Surveillance de 5 minutes après la deuxième dose du vaccin, si la première dose a été bien tolérée.
- Anaphylaxie grave (grade III-IV) d'origine incertaine ou non investiguée - Anaphylaxie idiopathique	Demander l'avis auprès d'un spécialiste en allergologie et immunologie clinique : Si le vaccin est possible, surveillance de 30 minutes après la vaccination ou selon avis du spécialiste.
- Mastocytose cutanée ou systémique - Tryptase basale élevée connue - Urticaire chronique ou syndrome d'activation mastocytaire - Urticaire localisée au site de la première dose du vaccin à ARN	Le vaccin peut être administré avec : - prémédication par un H1-antihistaminique (1 comprimé 60 minutes avant le vaccin). - surveillance 30 minutes après la vaccination.
- Réaction systémique / anaphylaxie connue aux composants du vaccin à ARN - Sensibilisation probable de type immédiat au polyéthylène glycol (PEG, macrogol) ou à la trométhamine (TRIS, trométamol) - Anaphylaxie après la première dose du vaccin à ARN	Vaccin à ARN contre-indiqué. Investigation auprès d'un spécialiste en allergologie et immunologie clinique.

Principe de base pour tous les lieux de vaccinations :

Une personne médicale ou paramédicale formée ayant directement accès à un équipement d'urgence comprenant de l'adrénaline (par exemple sous forme d'auto-injecteur Epipen® ou Jext®) doit être présent sur place lors de chaque vaccination pour évaluer et traiter toute réaction généralisée.

Question à poser avant la vaccination par le personnel médical ou paramédical :

1. Avez-vous déjà présenté une réaction allergique sévère, ayant nécessité une prise en charge en urgence ?
 - après l'utilisation d'un médicament injecté en sous-cutané, intramusculaire ou en intraveineux ?
 - après un vaccin ?
 - d'origine inconnue ou non investiguée ?

2. Avez-vous eu dans le passé de graves réactions allergiques à différents médicaments non apparentés y compris des laxatifs oraux contenant du polyéthylène glycol (PEG, macrogol) ou de la trométhamine (TRIS, trométamol) ?

Basé sur les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des USA: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html>