

Situations cliniques pour lesquelles le risque d'infections graves à VRS est possiblement augmenté

- Maladie pulmonaire chronique du prématuré OR 1,35 (IC 95% 1,23-1,48 p<0,0001),
- Maladie pulmonaire chronique congénitale, OR 3,30 (IC 95% 2,40-3,74 p<0,0001)
- Cardiopathies congénitales hémodynamiquement significatives, OR 3,37 (IC 95% 3,08-3,69 p<0,0001),
- Hypertension artérielle pulmonaire, OR 2,55 (IC 95% 2,01-3,24 p< 0,0001)
- Mucoviscidose, OR 1,99 (IC 95% 1,55-2,56 p<0,0001)
- Fistule trachéo-oesophagienne congénitale, OR 3,00 (IC 95% 2,40-3,74 p<0,0001)
- Hernie diaphragmatique, OR 3,06 (IC 95% 2,26-4,13 p< 0,0001)
- Immunodéficience (combinée, en anticorps ou autre étiologie), corticothérapie systémique à forte dose, transplantations d'organe solide, OR 9,76 (IC 95% 4,11-23,15 p<0,0001),
- Greffes de cellules souches, OR 5,83 (IC95% 3,00-11,33 p<0,0001),
- chimiothérapie immunosuppressive, autre traitement immunosuppresseur, et diagnostic d'une infection par le VIH OR 1,89 (IC 95% 1,09-3,29 p=0,023)
- Dystrophies musculaires, OR 4,35 (IC95% 3,15-6,01)
- Trisomie 21 OR 3,29 (IC95% 2,88-3,76 p<0,0001)